

Definición: El catéter ureteral o doble J consiste en un tubo delgado que se inserta de manera temporal para facilitar el paso de orina y ayuda a que el conducto urinario intervenido cicatrice mejor, no se obstruya ni se estreche.

Recomendaciones generales:

- Tomar los analgésicos y medicamentos como le fueron formulados.
- No permanecer acostado todo el tiempo, puede caminar, subir y bajar escalas.
- Iniciar alimentación después de la cirugía con líquidos claros (aromática, agua de panela, jugos o gelatinas) y si hay tolerancia, puede ingerir alimentos sólidos.
- Después del procedimiento es normal sentir ardor para orinar, ganas de orinar frecuentemente y que la orina tenga un poco de sangre.
- Después del procedimiento es normal presentar dolor en la parte baja del abdomen o en la parte baja de la espalda al terminar de orinar, estos síntomas no deben causar alarma, son ocasionados por el Catéter Doble J y mejorarán cuando éste se retire.

Recuerde hacer transcribir la orden para el retiro del Catéter Doble J y solicitar la cita para el retiro según indicación médica.

Consultar la IPS básica en caso de:

- Presenta dolor severo que no mejora con la analgesia.
- Presenta fiebre.
- Presenta vomito que no mejora.
- Sangrado muy abundante por la orina y con coágulos.
- Dificultad para orinar.
- Presenta dificultad para respirar.

