

Consiste en la extirpación total o parcial del prepucio, pliegue móvil de piel que cubre el glande del pene.

Recomendaciones generales:

- Tomar los analgésicos y medicamentos como le fueron formulados.
- No es necesaria la aplicación de cremas, solo en caso de que el médico tratante las formule.
- No permanecer costado todo el tiempo, puede caminar, subir y bajar escalas.
- Evitar el uso de bicicletas o triciclos hasta nueva indicación médica.
- Iniciar alimentación después de la cirugía con líquidos claros: aromática, agua de panela, jugos o gelatinas, y si hay tolerancia, puede ingerir alimentos sólidos.
- Después del procedimiento es normal sentir ardor para orinar.
- utilizar ropa amplia que no roce los genitales. Si usa pañales, deben quedar flojos.
- Retirar el vendaje al día siguiente a la cirugía.
- Lavar el pene con agua y jabón neutro a partir del día posterior a la cirugía, no frotar el pene.
- No manipular constantemente, para evitar infección o sangrado.
- Abstenerse de tener relaciones sexuales hasta nueva indicación médica.
- Solicitar la cita de revisión, según indicación médica.

Consultar la IPS básica en caso de:

- Dolor severo que no mejora con la analgesia.
- Fiebre.
- Sangrado continuo por la herida.
- Hematoma.
- Enrojecimiento, secreción, olor fétido, calor en la piel que rodea la herida.
- Vómito que no mejora.
- Dificultad para orinar.
- Dificultad para respirar.

