

Procedimiento en el que se resuelven principalmente los problemas estéticos o funcionales de la cara.

Recomendaciones generales:

- Tomar los analgésicos y medicamentos como le fueron formulados.
- No permanecer acostado todo el tiempo, puede caminar despacio y gradualmente.
- No mover o levantar objetos pesados hasta indicación médica.
- Iniciar alimentación después de la cirugía con líquidos claros: aromática, agua de panela, jugos, y si hay tolerancia, puede avanzar a dieta licuada o blanda según indicación médica.
- Es normal presentar vómito el primer día de color negro de sangre digerida.
- Utilizar la cabecera elevada para dormir.
- Aplicar hielo local envuelto en una toalla sobre los pómulos y maxilares cada hora por 15 minutos, durante las primeras 48 horas de la cirugía.
- Aplicar calor húmedo a partir del cuarto día de la cirugía según indicación médica.
- Puede cepillarse los dientes.
- No debe sonar la nariz hasta indicación médica.
- Evitar exponerse al sol.
- Asistir a la cita de revisión o solicitarla según indicación médica.

Consultar la IPS básica en caso de:

- Dolor severo que no mejora con la analgesia.
- Fiebre.
- Sangrado súbito abundante por la nariz y/o boca que no mejora.
- Salida de secreción u olor fétido.
- Vómito que no mejora.
- Dificultad para respirar.

