

La prostatectomía es una cirugía para extraer la próstata o una parte. Puede realizarse por medio de técnica abierta, laparoscópica o endoscópica, según la afección que se desee tratar. Luego del procedimiento puede requerir la implantación de una sonda vesical o dren de forma temporal.

Recomendaciones generales:

- Tomar los analgésicos y medicamentos como le fueron formulados.
- No permanecer acostado todo el tiempo, puede caminar, subir y bajar escalas.
- No mover o levantar objetos pesados hasta nueva indicación médica.
- Iniciar alimentación después de la cirugía con líquidos claros: aromática, agua de panela, jugos o gelatinas, y si hay tolerancia, puede ingerir alimentos sólidos.
- Si tiene herida y se encuentra suturada, debe dejarla con los apósitos con los que sale de la institución hasta la cita de revisión, no mojar los apósitos y manipular la herida. En la cita de revisión se retiran las suturas de la piel.
- Después del procedimiento es normal que la orina tenga un poco de sangre.
- La sonda vesical se retira según indicación médica.
- Si requirió la implantación de un dren se retirará según indicación médica.
- Solicitar la cita de revisión según indicación médica.

Consultar la IPS básica en caso de:

- Dolor severo que no mejora con la analgesia.
- Fiebre.
- Sangrado continuo por la herida.
- Hematoma.
- Enrojecimiento, secreción, olor fétido, calor en la piel que rodea la herida.
- Vómito que no mejora.
- Sangrado muy abundante por la orina y con coágulos.
- Dificultad para orinar o no se observa paso de la orina a la bolsa de recolección.
- Presentar salida del dren de su sitio.
- Dificultad para respirar.

