

Intervención que se realiza por vía endoscópica con el uso de un microscopio quirúrgico para la visualización de la laringe. El procedimiento puede ser realizado con finalidades diagnósticas o terapéuticas en caso de nódulos, pólipos, quistes, granulomas, tumores pequeños, parálisis de cuerdas vocales, estenosis, cicatrices, entre otros.

Recomendaciones generales:

- Tomar los analgésicos y medicamentos como le fueron formulados.
- No permanecer acostado todo el tiempo, puede caminar despacio y gradualmente.
- No mover o levantar objetos pesados hasta indicación médica.
- Iniciar alimentación después de la cirugía con líquidos claros: aromática, agua de panela, jugos o gelatinas, y si hay tolerancia, puede ingerir alimentos sólidos, según indicación médica.
- Evitar consumir alimentos duros, tostados y secos.
- Utilizar la cabecera elevada para dormir.
- Puede cepillarse los dientes.
- No hacer esfuerzo para eliminar secreciones de la garganta, evitar la tos y el carraspeo de forma brusca.
- Después de la cirugía puede presentar saliva mezclada con sangre.
- Después de la cirugía debe tener reposo de la voz, evitar conversar hasta indicación médica.
- Asistir a la cita de revisión o solicitarla, según indicación médica.

Consultar la IPS básica en caso de:

- Dolor severo que no mejora con la analgesia.
- Fiebre.
- Sangrado súbito abundante por boca que no mejora.
- Vómito que no mejora.
- Dificultad para respirar.

