

Es un crecimiento anormal del tejido sobre la superficie de la córnea. Puede presentarse como un abultamiento y suele empezar en la parte blanca del ojo. Si se deja avanzar, puede llegar a cubrir la córnea y obstaculizar la visión.

Recomendaciones generales:

- Tomar los analgésicos y administrar gotas oculares como le fueron formuladas.
- No permanecer acostado todo el tiempo, puede caminar despacio y gradualmente.
- Evitar acostarse del lado de la cirugía.
- Utilizar la cabecera elevada para dormir.
- No mover o levantar objetos pesados hasta nueva indicación médica.
- Evitar la manipulación del ojo operado, no sobar, ni rascar.
- Iniciar alimentación después de la cirugía con líquidos claros: aromática, agua de panela, jugos o gelatinas, y si hay tolerancia, puede ingerir alimentos sólidos.
- Evitar mojar los apósitos y ni retirar el protector ocular hasta la cita de revisión o según indicación médica.
- Utilizar el protector ocular para dormir.
- Utilizar gafas protectoras según indicación médica.
- Solicitar la cita de revisión según indicación médica.

Consultar la IPS básica en caso de:

- Dolor severo que no mejora con la analgesia.
- Fiebre.
- Secreción por el ojo.
- Cambios en la visión.
- Dificultad para respirar.

